

رشته: رياضي فيزيك	ساعت شروع: ۹ صبح	پايه: يازدهم دوره دوم متوسطه	سوالات امتحان هماهنگ درس: حسابان ۱
مدت امتحان: ۱۰۰ دقيقه	تعداد صفحات: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲ http://aee.medu.gov.ir			

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده، بلا مانع است.	بارم
۱	<p>درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) حاصل عبارت $100 + 100 + 100 + \dots + 100 = 2 + 4 + 6 + \dots + 250$ است.</p> <p>(ب) دو تابع $f(x) = x^2$ و $g(x) = \sqrt{x^2}$ با هم برابرند.</p> <p>(پ) در تابع $f(x) = a^x$، اگر $a > 1$، با افزایش مقدار x، مقادیر f افزایش می‌یابد.</p> <p>(ت) $\cos \alpha + \cos(\pi - \alpha) = 0$</p>	۱
۲	<p>درجاهای خالی عبارت مناسب قرار دهید.</p> <p>(الف) حاصل ضرب ریشه‌های معادله $4x^2 + 2x - 8 = 0$ مساوی است.</p> <p>(ب) مجموعه جواب معادله $\sqrt{x^2 - 9} + 2\sqrt{x - 3} = 0$، برابر می‌باشد.</p> <p>(پ) حاصل عبارت $\log_5 \sqrt[3]{25}$ برابر است.</p> <p>(ت) در دایره‌ای به شعاع ۳ متر، اندازه زاویه مرکزی رو به رو به کمانی به طول ۱۲ متر برابر رادیان است.</p>	۲
۳	<p>طول ضلع مربعی یک متر است. ابتدا نیمی از مساحت آن را رنگ می‌کنیم. سپس نیمی از مساحت باقی مانده را و به همین ترتیب در هر مرحله نیمی از مساحت باقی مانده از قبل را رنگ می‌کنیم. پس از دست کم چند مرحله حداقل ۹۹ درصد سطح مربع رنگ شده است؟</p>	۱/۲۵
۴	<p>در شکل زیر نمودار سهمی $p(x) = ax^3 + bx + c$ داده شده است. صفرهای تابع را در صورت وجود به دست آورید و ضابطه تابع را مشخص کنید.</p>	۱
۵	<p>یکی از اضلاع مربعی بر خط $1 - 2x = y$ واقع است. اگر $(3, 0)$ یکی از رئوس این مربع باشد، مساحت مربع را محاسبه کنید.</p>	۱
۶	<p>مشخص کنید هر نمودار زیر با کدام یک از توابع داده شده، متناظر است؟</p> <p>$f(x) = \frac{-1}{x}$, $g(x) = \sqrt{-x}$, $h(x) = -\sqrt{x}$, $r(x) = -\sqrt{-x}$, $t(x) = \frac{1}{x}$</p>	۱/۲۵

«ادامه سوالات در صفحه دوم»

رشته: رياضي فيزيك	ساعت شروع: ۹ صبح	پايه: يازدهم دوره دوم متوسطه	سوالات امتحان هماهنگ درس: حسابان ۱
مدت امتحان: ۱۰۰ دقيقه	تعداد صفحات: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	نام و نام خانوادگی:
مركز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش			دانش آموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲ http://aee.medu.gov.ir

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده، بلا مانع است.	بارم
۷	تابع $g(x) = x^3 - 2x + 3$ مفروض است. الف) نشان دهید تابع g ، یک به یک نیست. ب) با محدود کردن دامنه تابع g ، تابعی وارون پذیر به نام f بسازید و وارون آن را به دست آورید.	۱/۵
۸	تابع $f(x) = \frac{1}{x^3}$ و $g(x) = \sqrt[4]{4-x^2}$ مفروضند، دامنه تابع fog را با استفاده از تعریف به دست آورید.	۱
۹	خط $y = 1^x$ نمودار تابع $y = (1^x)$ را در چه نقطه‌ای قطع می‌کند؟ (راه حل نوشته شود)	۱
۱۰	معادله لگاریتمی مقابلا حل کرده و مجموعه جواب را مشخص کنید. $\log_3^{(x-1)} + \log_3^{(\frac{x+1}{2})} = 2$	۱/۵
۱۱	نمودار تابع $y = - \cos x + 1$ را در بازه $[0, 2\pi]$ رسم کرده و برد تابع را مشخص کنید. (مراحل رسم را نشان دهید)	۱/۲۵
۱۲	اگر $\tan \beta = -\frac{2}{5}$ و انتهای کمان α در ربع اول و β در ربع دوم باشد، مقدار دقیق $\sin 2\alpha$ و $\cos(\alpha + \beta)$ را بیابید.	۲/۲۵
۱۳	اگر بازه $(-1, 2)$ یک همسایگی راست محدود $y = 5x + 1$ باشد، مجموعه مقادیر x و y را به دست آورید.	۱
۱۴	با توجه به شکل، حاصل عبارت زیر را در صورت وجود به دست آورید. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) + 3f(1) - \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) =$	۱
۱۵	مقدار حدهای زیر را بیابید. (الف) $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 x -8}{x-2}$ (ب) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{5x}$	۱/۵
۱۶	مقادير a و b را چنان بیابيد که تابع f در نقطه‌ای به طول $x=0$ پیوسته باشد.	۱/۵
۲۰	"موفق باشید"	جمع نمره

ساعت شروع: ۹ صبح	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح سوالات امتحان هماهنگ درس: حسابان ۱
تعداد صفحات: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰	پایه: پا زدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲		مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش http://aee.medu.gov.ir

ردیف	بارم
۱	(۰/۲۵) ب) نادرست (۰/۲۵) (۰/۲۵) پ) درست (۰/۲۵) (۰/۲۵) ت) نادرست (۰/۲۵)
۲	(۰/۲۵) ت) ۴ (۰/۲۵) پ) ۳ (۰/۲۵) ب) ۳ (۰/۲۵) (۰/۲۵) -۲ (۰/۲۵) الف) (۰/۲۵)
۳	۱/۲۵ $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$ $S_n \geq \frac{99}{100}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} \geq \frac{99}{100}$ (۰/۲۵) \Rightarrow $1 - (\frac{1}{2})^n \geq \frac{99}{100}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow \frac{1}{100} \geq (\frac{1}{2})^n \Rightarrow 2^n \geq 100$ (۰/۲۵) $\Rightarrow n = 7$ (۰/۲۵)
۴	۱ تابع، صفری ندارد. (۰/۲۵) $y = a(x - 2)^r + 1$ (۰/۲۵) $\Rightarrow y = a(\circ - 2)^r + 1$ (۰/۲۵) \Rightarrow $a = \frac{1}{\circ}$ $\Rightarrow y = \frac{1}{\circ}(x - 2)^r + 1$ (۰/۲۵)
۵	۱ $d = \frac{ ax_{\circ} + by_{\circ} + c }{\sqrt{a^r + b^r}} = \frac{ 2 \times 3 - \circ - 1 }{\sqrt{4+1}} = \frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$ (۰/۷۵) $\Rightarrow S = 5$ (۰/۲۵)
۶	۱/۲۵ (۰/۲۵) هر مورد (۰/۲۵) $g(x)$ (۵) $h(x)$ (۴) $r(x)$ (۳) $f(x)$ (۲) $t(x)$ (۱)
۷	۱/۵ (الف) $g(x) = (x - 1)^r + 2$ (۰/۲۵) , $g(\circ) = g(2) = 3$ (۰/۲۵) ب) $f : [1, +\infty) \rightarrow R$ $f(x) = (x - 1)^r + 2$ (۰/۲۵) $x - 1 = \pm \sqrt{y - 2}$ (۰/۲۵) $\Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x - 2} + 1$ (۰/۵)
۸	۱ $D_f = R - \{\circ\}$ (۰/۲۵) , $D_g = [-2, 2]$ (۰/۲۵) $D_{fog} = \underbrace{\{x \in [-2, 2] \mid \sqrt{4 - x^r} \neq \circ\}}_{0/25} = (-2, 2)$ (۰/۲۵)
۹	۱ $1^{\circ} = (\circ / \circ 1)^x$ (۰/۲۵) $\Rightarrow 1^{\circ} = (1^{\circ - 1})^x$ (۰/۲۵) $\Rightarrow -2x = 1$ (۰/۲۵) $\Rightarrow x = \frac{-1}{2}$ (۰/۲۵)
۱۰	۱/۵ $\log_2(x - 1)(\frac{x}{2} + 1) = 2$ (۰/۲۵) $\Rightarrow (x - 1)(\frac{x}{2} + 1) = 4$ (۰/۲۵) $\Rightarrow x^2 + x - 2^{\circ} = 0$ (۰/۲۵) (۰/۲۵) $x = -5$ (۰/۲۵) و $x = 4$ (۰/۲۵) مجموعه جواب = $\{4\}$ (۰/۲۵)

ساعت شروع: ۹ صبح

رشته: ریاضی فیزیک

راهنمای تصحیح سوالات امتحان هماهنگ درس: حسابان ۱

تعداد صفحات: ۲

تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۵/۳۰

پایه: پاژدهم دوره دوم متوسطه

مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش

دانش آموزان روزانه داخل و خارج از کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۲

<http://aee.medu.gov.ir>

ردیف	بارم	
۱۱	 $R_f = [\circ, 1] \quad (0/25) \quad \text{هر مرحله رسم} \quad (0/25)$	۱/۲۵
۱۲	$\cos \alpha = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = \frac{4}{5} \quad (0/25) \quad , \quad \frac{1}{\cos^2 \beta} = 1 + \tan^2 \beta = \frac{9}{5} \quad (0/25)$ $\sin \beta = \cos \beta \tan \beta \quad (0/25) \quad , \quad \sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{24}{25} \quad (0/5)$ $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta = \frac{4}{5} \times \frac{-\sqrt{5}}{3} - \frac{2}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{-4\sqrt{5} - 6}{15} \quad (0/25)$	۲/۲۵
۱۳	$x - 1 = 3 \Rightarrow x = 4 \quad (0/5) \quad , \quad 2y + 5 > 3 \Rightarrow y > -1 \quad (0/5)$	۱
۱۴	$2 \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) + 3f(1) - \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2(-1) + 3(2) - \frac{4}{5} = \circ \quad (0/25)$	۱
۱۵	$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = 12 \quad (0/5) \quad \text{ب) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \sin 2x}{5x} = \frac{2}{5} \quad (0/5)$	۱/۵
۱۶	$f(\circ) = \frac{-a}{4} \quad (0/25), \quad \lim_{x \rightarrow \circ^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \circ^+} \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{2} \quad (0/5)$ $\lim_{x \rightarrow \circ^-} f(x) = b - \frac{1}{2} \quad (0/25) \Rightarrow a = -2 \quad (0/25) \quad , \quad b = 1 \quad (0/25)$	۱/۵
۲۰	جمع نمره	

مصححین گرامی: لطفا به راه حل های درست و منطبق بر کتاب درسی بارم به تناسب منظور شود.